Aurélio Fabiano Ribeiro Zago

Coloproctologia Colonoscopia/Manometria CRM/MG 37431

PREPARO INTESTINAL PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA

Paciente: Data do exame: Horário:							
				Conv	rênio:		
				Indicação:			
Local	l do Exame: Hospital Dr. Hélio Angotti (setor de internação)						
Orier	ntações Importantes:						
1.	Levar todos os exames recentes.						
2.	Se diabético, não tomar a insulina ou o comprimido (hipoglicemiante oral) na véspera e no dia do exame.						
3.	AAS em baixa dose geralmente não precisa ser suspenso, salvo se indicado pelo seu médico.						
4.	Se tomar a ticlopidina (Ticlid) ou clopidogrel (Plavix), suspender 5 (ci	nco) dias antes.					
5. Tome normalmente os medicamentos de uso contínuo no dia do exame, exceto se			eceber orientação				
	médica em contrário (como no caso de diabetes ou anticoagulantes)						
6.	Se houver a necessidade de antibioticoprofilaxia (portadores de p	róteses cardíacas, o	etc) comunicar ao				
	responsável pela marcação do exame.						
7.		s, Pradaxa) ou tem	prótese cardíaca,				
	informe antes da marcação para ajuste seguro do preparo.						
Medi	icamentos necessários para preparo intestinal:						
	Bisacodil (Lacto-Purga)5mg	04 comprimidos					
	Picoprep		nês				
Medi	icamentos que podem ser necessários durante o preparo in	testinal ou após	o exame:				
1.	Simeticona 125mg cápsulas gelatinosas		10 cápsulas				
	Tomar 01 cápsula até de 4 em 4 horas se gases.						
2.	Buscopan Composto		01 caixa				
	Tomar 01 comprimido de 8/8 horas caso tenha dor abdominal.						
3.	Vonau Flash 4mg		_ 01 caixa				
	Dissolver 01 comprimido na boca até de 4/4 horas se náuseas ou vômitos						

Avenida Santos Dumont, 2335 – Santa Maria

Aurélio Fabiano Ribeiro Zago

Coloproctologia Colonoscopia/Manometria CRM/MG 37431

Orientações para a véspera do exame:

- 1. Dieta Líquida clara a partir da 07:00 horas
 - a) Não poderá ser ingerido nenhum alimento sólido (nem bolacha, biscoito, etc);
 - b) Não beber líquidos vermelhos ou ingerir carne vermelha;
 - c) Ao longo do dia: água, água de coco, chá, café, sucos peneirados e coados, isotônicos, gelatina clara (sem corante vermelho ou roxo);
 - d) No almoço e jantar: escaldados ou sopa batida no liquidificador e peneiradas;
- 2. Tomar 02 comprimidos de Bisacodil às 10:00h e 02 comprimidos às 16:00h;
- 3. Tomar o medicamento PICOPREP® da seguinte forma:

<u>1º Dose</u> - Às 13:00 hrs., o conteúdo de 01 caixa (02 sachês) de PICOPREP® deverão ser dissolvidos em um copo de água em temperatura ambiente (aproximadamente 150mL). Agitar por 2 a 3 minutos. A solução pode ficar quente enquanto o produto se dissolve. Caso isso aconteça, aguardar que a solução resfrie para depois bebê-la. Após este 1º sachê, deverá ingerir **2 litros** de água ou líquidos claros sem resíduos (líquidos transparentes) no intervalo de até 2 horas. Ex: Água, chá, refrigerante, suco peneirados, isotônicos, água de coco, etc.

<u>2ª Dose</u> – Às 19:00 hrs, o conteúdo da segunda caixa (02 sachês) de PICOPREP® deverão ser dissolvidos em um copo de água (aproximadamente 150mL). Agitar por 2 a 3 minutos. Aguardar a solução resfriar e depois bebê-la. Após este 2º sachê, deverá ingerir 2 litros de água ou líquidos claros sem resíduos (líquidos transparentes) no intervalo de 3 horas. Ex: Água, chá, refrigerante, suco peneirados, isotônicos, água de coco, etc.

4. Líquidos claros poderão ser ingeridos até meia noite. Após meia noite Dieta Zero.

Observações:

- 1. Caso apresente náuseas ou vômitos tome Vonau conforme recomendações acima.
- 2. Se não houver melhora das náuseas e/ou vômitos comunicar ao Dr. Aurélio;
- 3. Permaneça em jejum total após a meia noite.
- 4. A qualidade do exame depende diretamente da ingestão de todo o volume de líquidos indicados.
- 5. Não dirigir após o exame (devido à sedação).
- 6. Você deverá chegar ao local do exame com 30 minutos antes do horário marcado, com <u>a presença</u> obrigatória de um acompanhante e com a guia do exame (se convênios) previamente autorizada.
- 7. Caso ainda esteja apresentando evacuações com fezes sólidas no dia do exame entre em contato com o Dr. Aurélio através dos telefones 34 3322-4111 (Nayana-secretária) / 34 9199-63-69 (Dr. Aurélio).